

Etat début juin 2026 / adapté du plan de vaccination suisse / nous déclinons toute responsabilité en cas d'erreur

Maladie(s) ciblée(s)	Pour qui ? (Dès 16 ans en pharmacie)	Nombre de doses / Rappels	Informations pratiques
Coqueluche	Adultes de 25 ans, femmes enceintes et entourage régulier de nourrissons de moins de 6 mois.	1 dose de rappel à 25 ans. 1 dose à chaque grossesse (2e trimestre privilégié). Rappel tous les 10 ans pour l'entourage des bébés si la dernière dose remonte à 10 ans ou plus.	Administrée sous forme de vaccin combiné avec le Tétanos et la Diphtérie (dTpa).
Covid-19	Personnes de 65 ans et plus, femmes enceintes (2e ou 3e trimestre) et personnes dès 16 ans avec une maladie chronique (diabète, asthme sévère, insuffisance cardiaque, etc.).	1 dose annuelle en automne ou en hiver.	Idéalement administré entre mi-octobre et décembre avec un vaccin adapté aux variants circulants de manière préférentielle.
Diphtérie et Tétanos	Tous les adultes (recommandation générale) et rattrapage si le statut vaccinal est incomplet ou inconnu.	Rappels réguliers à 25 ans et 45 ans, puis tous les 10 ans dès l'âge de 65 ans. Rattrapage en 3 doses si jamais vacciné (aux temps 0, 2 et 8 mois).	L'intervalle de rappel de routine est de 20 ans entre 25 et 64 ans, puis passe à 10 ans dès 65 ans car l'immunité faiblit chez les seniors. Un rappel est indiqué en cas de plaie si la dose précédente remonte à plus de 5 ou 10 ans.
FSME (Encéphalite à tiques)	Toute personne dès 16 ans résidant ou séjournant temporairement dans une zone à risque et s'exposant aux tiques.	3 doses pour le schéma de base (aux temps 0, 1, puis 6 à 12 mois). Rappel recommandé tous les 10 ans.	L'ensemble de la Suisse (hors Tessin) est considéré comme zone à risque. Un schéma de vaccination rapide (intervalle réduit à 14 jours entre les deux premières doses) est possible si nécessaire.
Grippe saisonnière (Influenza)	Personnes de 65 ans et plus, femmes enceintes, personnel médical et soignant et entourage de personnes vulnérables ou de bébés de moins de 6 mois.	1 dose chaque année à renouveler à l'automne.	Un vaccin antigrippal à dose élevée est spécifiquement privilégié pour les personnes dès l'âge de 75 ans ou dès 65 ans avec un facteur de risque en raison de sa meilleure efficacité confirmée.
Hépatite A	Adultes exposés à un risque accru de complications ou d'exposition (voyageurs en pays d'endémie, maladies hépatiques chroniques, usagers de drogues, partenaires sexuels multiples, etc.).	2 doses administrées aux temps 0 et 6 mois.	Peut être réalisé avec un vaccin combiné contre les hépatites A et B dès 16 ans (schéma en 3 doses à 0, 1 et 6 mois). Le schéma complet offre une protection de très longue durée, probablement à vie.
Hépatite B	Adultes présentant un risque d'exposition non vaccinés durant l'enfance (partenaires sexuels multiples, personnel médical et soignant, voyages en zone d'endémie, etc.).	3 doses pour les adultes dès 16 ans (schéma classique aux temps 0, 1 et 6 mois).	L'objectif de santé publique est d'assurer une couverture complète. Le rattrapage est expressément recommandé pour les personnes exposées, quel que soit leur âge.
Herpès Zoster (Zona)	Personnes de 65 ans et plus, adultes dès 50 ans avec une immunodéficience actuelle ou prévisible et patients dès 18 ans avec une immunodéficience sévère ou traitement immunosuppresseur.	2 doses du vaccin sous-unitaire adjuvanté Shingrix (aux temps 0 et 2 mois).	Recommandé pour prévenir le zona et ses douleurs nerveuses chroniques invalidantes, indépendamment des antécédents de varicelle ou de zona. Aucun rappel n'est préconisé après les deux doses.
Méningocoques	Adolescents de 16 à 19 ans pour rattrapage et adultes présentant un risque accru de maladie invasive ou d'exposition.	1 dose pour le type quadrivalent MCV-ACWY chez les 16-19 ans. 2 doses à intervalle d'un mois pour le type 4CMenB chez les adolescents. Rappel tous les 5 ans si le risque persiste.	Les jeunes de 15 à 19 ans présentent la deuxième incidence spécifique de maladie invasive la plus élevée de Suisse. La vaccination de rattrapage est possible jusqu'au 20e anniversaire.

Papillomavirus (HPV)	Jeunes adultes de 20 à 26 ans (vaccination complémentaire) et adolescents de 15 à 19 ans (rattrapage).	3 doses administrées aux temps 0, 2 et 6 mois pour toute personne débutant le schéma à 15 ans ou plus.	La vaccination concerne désormais les garçons comme les filles. Même après le début de l'activité sexuelle, le vaccin reste indiqué pour protéger contre les autres types de virus couverts par le vaccin.
Pneumocoques	Personnes de 65 ans et plus et adultes de 18-64 ans avec un facteur de risque clinique (insuffisance cardiaque, BPCO sévère, asthme sévère, cirrhose hépatique, insuffisance rénale, etc.).	1 dose unique avec un vaccin conjugué PCV20 ou PCV21. Pas de rappel régulier préconisé après un PCV de valence supérieure.	Le PCV15 n'est plus recommandé comme option vaccinale pour les adultes. Si un senior de 65 ans ou plus a déjà été vacciné avec le PCV13 ou le PCV15, une dose unique supplémentaire de PCV21 ou PCV20 est requise après 1 an pour élargir la couverture.
Poliomyélite	Adultes non vaccinés au préalable (rattrapage) ou voyageurs se rendant dans des pays présentant un risque d'exposition au poliovirus.	3 doses aux temps 0, 2 et 8 mois pour la primovaccination de rattrapage des adultes.	Aucune autre dose n'est nécessaire après une vaccination de l'enfance complète en l'absence de risque d'exposition. Des rappels supplémentaires (tous les 10 ans) ne concernent que les cas d'exposition accrue.
Rougeole, Oreillons, Rubéole (ROR)	Toute personne née après 1963 sans preuve d'une vaccination complète documentée.	2 doses au total, administrées avec un intervalle minimal de 4 semaines entre les doses. Aucun rappel.	Essentiel à vérifier pour les femmes en âge de procréer avant d'initier une grossesse (les vaccins vivants sont contre-indiqués pendant la gestation). Offre une protection durable considérée comme valable à vie.
Varicelle	Adultes de moins de 40 ans non vaccinés ou partiellement vaccinés sans historique de varicelle. Personnes dès 40 ans non immunes dans des situations à risque spécifiques.	2 doses administrées à un intervalle d'au moins 4 semaines.	La vaccination permet d'éviter les formes sévères de la maladie chez l'adulte. En cas de protection incomplète contre la rougeole également, la vaccination de rattrapage peut être réalisée avec un vaccin combiné quadrivalent RORV.
Virus respiratoire syncytial (VRS)	Femmes enceintes à partir de 18 ans dont le terme de grossesse se situe entre début octobre et fin mars. Femmes enceintes: possible en pharmacie uniquement sur ordonnance	1 dose unique avec le vaccin autorisé Abrysvo.	La dose s'administre entre les semaines de grossesse 32 et 36 afin d'assurer la transmission maximale des anticorps maternels au fœtus pour l'hiver. Actuellement recommandée une seule fois et non à chaque grossesse. Les recommandations pour les seniors (plus de 75 ans) sont à discuter avec le médecin traitement au cas par cas.